

Es refereix a: _____

Data de naixement: _____

Benvolgut col·lega,

Donada l'evidència cardiològica i /o genètica de la síndrome de Brugada en el pacient esmentat anteriorment, li aconsellem que no ha de prendre les següents medicacions:

FÀRMACS A EVITAR COMPLETAMENT

Medicaments antiarítmics: ajmalina, flecaïnida, pilsicainida, procaïnamida, propafenona

Psicòtrops: amitriptilina, clomipramina, desipramina, liti, loxapina, nortriptilina, trifluoperazina

Anestèsics: bupivacaine, propofol

Altres substàncies: acetilcolina, alcohol (dosi tòxiques), cocaïna, ergonovina

FÀRMACS A EVITAR SEMPRE QUE SIGUI POSSIBLE

Medicaments antiarítmics: amiodarona, cibenzolina, disopiramida, lidocaïna*, propranolol, verapamil

Psicòtrops: carbamazepina, ciamemazina, dosulepina, doxepina, fluoxetina, fluvoxamina, imipramina, maprotilina, perfenazina, fenitoïna, tioridazina

Anestèsics: ketamine

Altres substàncies: dimenidrinato, difenhidramina, edrofonio, indapamida, terfenadina / fexofenadina

* L'ús de lidocaïna per l'anestèsia local (per exemple pels dentistes) sembla ser segura sempre que s'utilitzin dosis baixes i si es combina amb adrenalina (epinefrina) ja que s'aconsegueix un efecte estrictament local.

En cas de febre, es recomana fer un seguiment electrocardiogràfic en combinació amb la disminució de la temperatura del cos (per exemple, mitjançant l'ús de paracetamol / acetaminofeno).

Si us plau, recordeu que moltes prescripcions contenen una combinació de fàrmacs actius. A més, la presència o absència d'un medicament en particular en aquesta llista no pressuposa un ús nociu o segur d'aquesta droga en particular a aquest pacient.

Per obtenir les recomanacions més recents (i l'exempció de responsabilitat) sobre les drogues que han d'evitar els pacients amb síndrome de Brugada, si us plau, visiteu <http://www.brugadadrugs.org>

Atentament,
