

Betreft: _____

Geboren: _____

Geachte collega,

In verband met cardiologische of genetische aanwijzingen voor Brugada syndroom in bovengenoemde patiënt adviseerde ik hem/haar de volgende medicatie *te vermijden*:

VERBODEN MEDICAMENTEN

Anti-aritmische medicamenten: Ajmaline, Flecainide, Pilsicainide, Procainamide, Propafenone

Medicijnen ingrijpend op het centraal zenuwstelsel (anti-depressiva/anti-epileptica): Amitriptyline, Clomipramine, Desipramine, Lithium, Loxapine, Nortriptyline, Oxcarbazepine, Trifluoperazine

Anesthetica / analgetica: Bupivacaine, Propofol

Andere substanties: Acetylcholine, Alcohol (toxiciteit), Cocaine, Ergonovine

ONGEWENSTE MEDICAMENTEN

Anti-aritmische medicamenten: Amiodarone, Cibenzoline, Disopyramide, Lidocaine*, Propranolol, Verapamil

Medicijnen ingrijpend op het centraal zenuwstelsel (anti-depressiva/anti-epileptica): Carbamazepine, Cyamemazine, Dosulepine, Doxepine, Fluoxetine, Fluvoxamine, Imipramine, Maprotiline, Paroxetine, Perphenazine, Phenytoin, Thioridazine

Anesthetica / analgetica: Ketamine, Tramadol

Andere substanties: Demenhydrinate, Diphenhydramine, Edrophonium, Indapamide, Metoclopramide, Terfenadine/Fexofenadine.

* Lidocaine gebruik voor locale anesthesie (bv. door tandartsen) lijkt veilig als de gebruikte hoeveelheid laag is en wordt gecombineerd met adrenaline/epinefrine aangezien er dan alleen een lokaal effect wordt bereikt.

Wees bij combinatie geneesmiddelen bedacht op de actieve geneesmiddelen. Tevens, de aanwezigheid *of afwezigheid* van geneesmiddelen op deze lijst is niet gelijk aan, respectievelijk, een zeker schadelijk *of veilig* geneesmiddel gebruik in deze patiënt.

Tenslotte moet bij hoge koorts oplettenheid worden betracht en de lichaamstemperatuur worden verlaagd (met bijvoorbeeld paracetamol).

Voor de meest recente aanbevelingen (en de disclaimer) ten aanzien van medicamenten die vermeden dienen te worden door Brugada syndroom patiënten, bezoek svp. <http://www.brugadadrugs.org>

Met collegiale hoogachting,
