

לכבוד הרופא המטפל:

אצל הפציינט הנ"ל התגלו סימנים קליניים, אלקטרוקרדיוגרפים או גנטיים שמתאימים או מחשידים לקיום התסמונת ע"ש ברוגדה (Brugada syndrome). להלן רשימה של תרופות שעלולות להחמיר את הנטייה להפרעות קצב מסכנות חיים אצל חולי ברוגדה. אני ממליץ להימנע משמוש בכל התרופות שברשימה.

תרופות אסורות לשימוש

1. תרופות אנטיאריטמיות: Ajmaline, Flecainide, Pilsicainide, Procainamide, Propafenone

2. תרופות בפסיכיאטריה: Amitriptyline, Clomipramine, Desipramine, Lithium, Loxapine, Nortriptyline, Oxcarbazepine, Trifluoperazine

3. Anesthetics: Bupivacaine, Propofol תרופות בהרדמה:

4. תרופות אחרות: Acetylcholine, Cocaine, Ergonovine וגם שתיית אלכוהול בכמויות טוקסיות.

תרופות שעדיף להימנע משימוש בהן

1. תרופות אנטיאריטמיות: Amiodarone, Cibenzoline, Disopyramide, Lidocaine*, Propranolol, Verapamil

2. תרופות בפסיכיאטריה: Carbamazepine, Cyamemazine, Dosulepine, Doxepine, Fluoxetine, Fluvoxamine, Imipramine, Maprotiline, Paroxetine, Perphenazine, Phenytoin, Thioridazine

3. Anesthetics: Ketamine, Tramadol תרופות בהרדמה:

4. תרופות אחרות: Demenhydrinate, Diphenhydramine, Edrophonium, Indapamide, Metoclopramide, Terfenadine/Fexofenadine

*נראה שאין סיכון בשימוש בלידוקאין בהרדמה מקומית.

חשוב: במקרים של חום גבוה רצוי לבצע מעקב קליני ואלקטרוקרדיוגרפי תוך כדי מתן תרופות להורדת חום.

שים לב: העובדה שתרופה כלשהי לא מופיעה ברשימה שלנו לא מבטיחה שהיא בטוחה בחולי ברוגדה.

עדכון מתמיד של המלצות לחולי ברוגדה לרבות עדכון רשימת התרופות האסורות לשימוש ניתן למצוא באתר: <http://www.brugadadrugs.org>

בכבוד רב,