

# INFORMASJON OM BRUK AV LEGEMIDLER VED BRUGADAS SYNDROM

Angående: \_\_\_\_\_

Fødselsdato/personnummer: \_\_\_\_\_

Kjære kollega.

Denne pasienten har kliniske og/eller genetiske tegn på såkalt Brugadas syndrom. Derfor anbefales han/hun å unngå bruk av følgende legemidler/substanser. Aktuelle substanser som for tiden ikke er tilgjengelige på norske apotek, er satt i klammer [ ].

## **LEGEMIDLER/SUBSTANSER SOM SKAL UNNGÅS:**

Antiarytmiske medisiner: [Ajmalin], Flekainid, [Pilsikainid], [Prokainamid], [Propafenon]

Psykotrimedisiner: Amitriptylin, Klomipramin, [Desipramin], Lithium, [Loxapine], Nortriptylin, [Trifluoperazin]

Anestesimidler: Bupivakain, Propofol

Andre substanser: [Acetylkolin], Alkohol (overdose), [Kokain], [Ergonovin]

## **LEGEMIDLER/SUBSTANSER SOM HELST SKAL UNNGÅS:**

Antiarytmiske medisiner: Amiodaron, [Cibenzolin], Disopyramid, Lidokain\*, Propranolol, Verapamil

\* Lidokain for lokalanestesi (for eks. hos tannlege) synes trygt når dosen er lav og kombineres med adrenalin (epinefrin), som begrenser substansens spredning.

Psykotrimedisiner og antiepileptika: Karbamazepin, [Cyamemazin], [Dosulepin], [Doxepin], Fluoxetin, Fluvoxamin, [Imipramin],[Maprotilin], [Perfenazin], Fenytoin, [Thioridazin]

Anestesimidler: Ketamin

Andre substanser: [Indapamid], [Edrofonium], [Demenhydrinat], [Diphenhydramin] [Terfenadin/Fexofenadin]

I forbindelse med feber anbefales EKG-overvåkning og senkning av kroppstemperaturen med for eks. Paracetamol (Acetaminofen). Vær oppmerksom på at uheldige medikamenter kan inngå i medisiner som består av en kombinasjon av substanser.

Vær oppmerksom på at medikamenter som er oppført på denne listen, ikke nødvendigvis medfører skade hos den aktuelle pasient, og det at en medisin ikke er oppført på listen, garanterer ikke at den trygt kan gis. For oppdatering av anbefalingene om hvilke medisiner som skal unngås hos pasienter med Brugadas syndrom, vennligst besøk denne internett-hjemmesiden: <http://www.brugadadrugs.org>.

Hilsen,

\_\_\_\_\_