

IDENTIFICAÇÃO: _____

DATA DE NASCIMENTO: _____

Caro colega,

Devido as evidências clínicas e/ou genéticas de síndrome de Brugada neste paciente supra-citado, aconselho que ele/ela não utilize os seguintes medicamentos:

DROGAS CONTRA-INDICADAS

Antiarrítmicos: Ajmalina, Flecainida, Pilsicainida, Procainamida, Propafenona

Psicotrópicos: Amitriptilina, Clomipramina, Desipramina, Lítio, Loxapina, Nortriptilina, Oxcarbazepina, Trifluoperazina

Anestésicos / analgésicos: Bupivacaína, Propofol

Outras substâncias: Acetilcolina, Álcool (intoxicação), Cocaína, Ergonovina

DROGAS QUE DEVEM SER EVITADAS

Antiarrítmicos: Amiodarona, Cibenzolina, Disopiramida, Lidocaina*, Propranolol, Verapamil

Psicotrópicos: Carbamazepina, Ciamemazina, Dosulepina, Doxepina, Fluoxetina, Fluvoxamina, Imipramina, Maprotilina, Paroxetina, Perfenazina, Fenitoina, Tioridazina

Anestésicos / analgésicos: Ketamin, Tramadol

Outras substâncias: Demenidrinato, Difenidramina, Edrofonio, Indapamida, Metoclopramida, Terfenadina/Fexofenadina

* O uso de Lidocaina para anestesia local (ex: por dentistas) parece ser seguro se a dose administrada é baixa e se é combinada com adrenalina (epinefrina) que não resulta em efeito sistêmico.

Adicionalmente, em caso de febre, uma monitorização eletrocardiográfica contínua é indicada, em combinação com medidas para redução da temperatura corporal (ex: usar Paracetamol/Acetaminofeno).

Por favor, cuidado com drogas que contenham combinação de medicamentos. Além disso, a presença ou ausência de uma droga em particular nesta lista não define risco ou segurança do uso dessa droga neste paciente em particular.

Para as recomendações mais atualizadas (e termo de responsabilidade) sobre drogas que devem ser evitadas nos pacientes portadores da síndrome de Brugada, por favor visite <http://www.brugadadrugs.org> .

Atenciosamente,
