

Se refiere a: _____

Fecha de nacimiento: _____

Estimado colega,

Debido a la evidencia cardiológica y/o genética del síndrome de Brugada en el paciente mencionado anteriormente, le aconsejamos que no debe tomar las siguientes medicaciones:

FÀRMACOS A EVITAR COMPLETAMENTE

Medicamentos antiarrítmicos: ajmalina, flecainida, pilsicainida, procainamida, propafenona

Psicotròpicos: amitriptilina, clomipramina, desipramina, litio, loxapina, nortriptilina, Trifluoperazina

Anestésicos: bupivacaína, propofol

Otras sustancias: acetilcolina, alcohol (dosis tóxicas), cocaína, ergonovina

FÀRMACOS A EVITAR SIEMPRE QUE SEA POSIBLE

Medicamentos antiarrítmicos: amiodarona, cibenzolina, disopiramida, lidocaína*, propranolol, verapamilo

Psicotròpicos: carbamazepina, ciamemazina, dosulepina, doxepina, fluoxetina, fluvoxamina, imipramina, maprotilina, perfenazina, fenitoína, tioridazina

Anestésicos: ketamine

Otras sustancias: demenidrinato, difenidramina, edrofonio, indapamida, terfenadina / fexofenadina

* El uso de lidocaína para la anestesia local (por ejemplo por los dentistas) parece ser segura siempre que se utilicen dosis bajas y si se combina con adrenalina (epinefrina) ya que se consigue un efecto estrictamente local.

En caso de fiebre, se recomienda hacer un seguimiento electrocardiográfico en combinación con la disminución de la temperatura del cuerpo (por ejemplo, mediante el uso de paracetamol / acetaminofeno).

Por favor, recuerden que muchas prescripciones contienen una combinación de fármacos activos. Además, la presencia *o ausencia* de un medicamento en particular en esta lista no presupone un uso nocivo *o seguro* de esa droga en particular en este paciente.

Para obtener las recomendaciones más recientes (y la exención de responsabilidad) sobre las drogas que deben ser evitadas por los pacientes con síndrome de Brugada, por favor, visite <http://www.brugadadrugs.org>

Atentamente,
