

คนไข้ ชื่อ \_\_\_\_\_

วันเกิด \_\_\_\_\_

เรียน แพทย์ผู้เกี่ยวข้อง:

จากหลักฐานการวิจัยของทางหัวใจและพันธุศาสตร์ ของ Brugada syndrome ที่ผู้ป่วยรายนี้ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น  
ผมขอถือโอกาสแนะนำให้คุณหมอต้องระวังการใช้ยาบางอย่าง ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ในคนไข้ที่เป็น Brugada syndrome  
ดังรายการต่อไปนี้

1. ยาที่ห้ามใช้อย่างเด็ดขาด

Antiarrhythmic drugs: Ajmaline, Flecainide, Pilsicainide, Procainamide, Propafenone

Psychotropic drugs: Amitriptyline, Clomipramine, Desipramine, Lithium, Loxapine, Nortriptyline,  
Oxcarbazepine, Trifluoperazine

Anesthetics / analgesics: Bupivacaine, Propofol

Other substances: Acetylcholine, Alcohol (toxicity), Cocaine, Ergonovine

2. ยาที่ไม่ควรใช้

Antiarrhythmic drugs: Amiodarone, Cibenzoline, Disopyramide, Lidocaine\*, Propranolol, Verapamil

Psychotropic drugs: Carbamazepine, Cyamemazine, Dosulepine, Doxepine, Fluoxetine, Fluvoxamine,  
Imipramine, Maprotiline, Paroxetine, Perphenazine, Phenytoin, Thioridazine

Anesthetics / analgesics: Ketamine, Tramadol

Other substances: Demenhydrinate, Diphenhydramine, Edrophonium, Indapamide, Metoclopramide,  
Terfenadine/Fexofenadine

\*สำหรับยา Lidocaine ซึ่งใช้เป็นยาชาเฉพาะที่ เช่นการทำฟัน ก่อนข้างปลอดภัยโดยเฉพาะเมื่อผสมร่วมกับ  
แอดรีนาลินเพราะมีปริมาณยาที่เข้าสู่หลอดเลือดและร่างกาย น้อยมาก และจะไม่เป็นอันตรายต่อคนไข้

นอกเหนือไปจากยา ภาวะอื่นที่ต้องระวังคือการเป็นไข้ ถ้าคนไข้คนนี้เป็นไข้  
ขอแนะนำให้ทำการลดไข้อย่างรวดเร็วเช่นให้ยา acetaminophen และควรเฝ้าดูคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) อย่างใกล้ชิด  
เพื่อสามารถวินิจฉัยหัวใจเต้นผิดปกติได้อย่างรวดเร็ว

สิ่งสำคัญที่พึงระวังคือ การใช้ยาที่มีส่วนผสมหลายชนิด แม้ว่าชื่อยาจะไม่ได้อยู่ในรายการข้างบนนี้  
ก็อาจจะมียาอย่างอื่นผสมอยู่ด้วยที่เราอาจไม่ทราบทั้งหมด และอาจเป็นอันตรายได้เสมอ

รายการยาข้างบนนี้จะมีการปรับปรุงเสมอ เราไม่สามารถบอกได้ว่าจะเป็นรายการที่สมบูรณ์ ถ้าท่านสนใจที่จะติดตามเรื่องนี้  
กรุณาติดตามได้ที่ <http://www.brugadadrugs.org> .

ขอแสดงความนับถือ