

คนไข้ ชื่อ _____

วันเกิด _____

เรียน แพทย์ผู้เกี่ยวข้อง:

จากหลักฐานการวิจัยของทางหัวใจและพันธุศาสตร์ ของ Brugada syndrome ที่ผู้ป่วยรายนี้ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น ผมขอถือโอกาสแนะนำให้คุณหมอต้งระวังการใช้ยาบางอย่าง ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ในคนไข้ที่เป็น Brugada syndrome ดังรายการยาต่อไปนี้

1. ยาที่ห้ามใช้อย่างเด็ดขาด

Antiarrhythmic drugs: Ajmaline, Flecainide, Pilsicainide, Procainamide, Propafenone

Psychotropic drugs: Amitriptyline, Clomipramine, Desipramine, Lithium, Loxapine, Nortriptyline, Trifluoperazine

Anesthetics: Bupivacaine, Propofol

Other substances: Acetylcholine, Alcohol (toxicity), Cocaine, Ergonovine

2. ยาที่ไม่ควรใช้

Antiarrhythmic drugs: Amiodarone, Cibenzoline, Disopyramide, Lidocaine*, Propranolol, Verapamil

Psychotropic drugs: Carbamazepine, Cyamemazine, Dosulepine, Doxepine, Fluoxetine, Fluvoxamine, Imipramine, Maprotiline, Perphenazine, Phenytoin, Thioridazine

Anesthetics: Ketamine

Other substances: Demenhydrinate, Diphenhydramine, Edrophonium, Indapamide, Terfenadine/Fexofenadine

*สำหรับยา Lidocaine ซึ่งใช้เป็นยาชาเฉพาะที่ เช่นการทำฟัน ค่อนข้างปลอดภัยโดยเฉพะเมื่อผสมร่วมกับ แอดรีนาลีนเพราะมีปริมาณยาที่เข้าสู่หลอดเลือดและร่างกาย น้อยมาก และจะไม่เป็นอันตรายต่อคนไข้

นอกเหนือไปจากยา ภาวะอื่นที่จะต้องระวังคือการเป็นไข้ ถ้าคนไข้คนนี้เกิดเป็นไข้ ขอแนะนำให้ทำการลดไข้อย่างรวดเร็วเช่นให้ยา acetaminophen และควรเฝ้าดูคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) อย่างใกล้ชิด เพื่อสามารถวินิจฉัยหัวใจเต้นผิดปกติได้อย่างรวดเร็ว

สิ่งสำคัญที่พึงระวังคือ การใช้ยาที่มีส่วนผสมหลายชนิด
แม้ว่าชื่อยาจะไม่ได้อยู่ในรายการข้างบนนี้
ก็อาจจะมียาอย่างอื่นผสมอยู่ด้วยที่เราอาจไม่ทราบทั้งหมด และอาจเป็นอันตรายได้เสมอ

รายการยาข้างบนนี้จะมีการปรับปรุงเสมอ
เราไม่สามารถบอกได้ว่าจะเป็นรายการที่สมบูรณ์ ถ้าท่านสนใจที่จะติดตามเรื่องนี้
กรุณาติดตามได้ที่ <http://www.brugadadrugs.org> .

ขอแสดงความนับถือ
