

Angående: _____

Fødselsdato: _____

Kære kollega,

Grundet kardiologiske og/eller genetiske holdepunkter for Brugada Syndrom hos ovenstående patient, er han/hun af undertegnede anbefalet ikke at indtage følgende lægemidler/stoffer:

LÆGEMIDLER/STOFFER SOM SKAL UNDGÅS

Antiarytmika*: Ajmalin, allapinin, ethacizin, flecainid, pilsicainid, procainamid, propafenon

Psykofarmaka: Amitriptylin, clomipramin, desipramin, lithium, loxapin, nortriptylin, oxcarbazepin, triflourperazin

Anæstetika/analgetika*: Bupivacain, procain, propofol

Andet: Acetylcholin, alkohol (toksiske doser), cannabis, kokain, ergonovin

*: For yderligere rådgivning henvises til www.brugadadrugs.org/emergencies

LÆGEMIDLER/STOFFER SOM BØR UNDGÅS

Antiarytmika: Amiodaron, cibenzolin, disopyramid, lidokain**, propranolol, verapamil, vernakalant

Psykofarmaka: Bupropion, carbamazepin, clothiapin, cyamemazin, dosulepin, doxepin, fluoxetin, fluzoxamin, imipramin, lamotrigin, maprotilin, paroxetin, perphenazin, phenytoin, thioridazin

Anæstetika/analgetika: Ketamin, tramadol

Andet: Demenhydrinat, diphenhydramin, edrophonium, indapamid, metoclopramid, terfenadin/ fexofenadin

** : Lidokain brugt som lokalanæstesi (fx af tandlæger) synes at være sikkert hvis den administrerede dosis er lav og hvis det er kombineret med adrenalin, som giver en lokal effekt af lægemidlet.

Vær venligst opmærksom på de aktive stoffer som findes i kombinationspræparater. Tilstedeværelse eller fravær af et lægemiddel på denne liste bevirker ikke en bestemt skadelig henholdsvis sikker brug af lægemidlet hos denne patient.

For senest opdaterede rekommandationer (og disclaimer) angående lægemidler som skal/bør undgås af patienter med Brugada Syndrom henvises til www.brugadadrugs.org.

Med venlig hilsen
