

이름: \_\_\_\_\_

생년 월일: \_\_\_\_\_

친애하는 선생님께

상기 환자 분, 부루가다 증후군을 의미하는 유전적 또는 심장 관련 증거를 가지고 있어, 환자가 다음과 같은 약물을 복용하지 않도록 주의를 기울여야 합니다.

#### **반드시 피해야 하는 약물**

항부정맥제\*: Ajmaline, Allapinine, Ethacizine, Flecainide, Pilsicainide, Procainamide, Propafenone

항정신성 의약품: Amitriptyline, Clomipramine, Desipramine, Lithium, Loxapine, Nortriptyline, Oxcarbazepine, Trifluoperazine

진통제 / 마취제\*: Bupivacaine, Procaine, Propofol

기타 약물들: Acetylcholine, Alcohol (toxicity), Cannabis, Cocaine, Ergonovine

\*부루가다 증후군 할 약에 대한 가장 최근의 권고 사항을 확인하려면, <http://www.brugadadrugs.org/emergencies> 사이트를 방문하여 주십시오

#### **가능한 한 피해야 하는 약물**

항부정맥제: Amiodarone, Cibenzoline, Disopyramide, Lidocaine\*, Propranolol, Verapamil, Vernakalant

항정신성 의약품: Bupropion, Carbamazepine, Clothiapine, Cyamemazine, Dosulepine, Doxepine, Fluoxetine, Fluvoxamine, Imipramine, Lamotrigine, Maprotiline, Paroxetine, Perphenazine, Phenytoin, Thioridazine

진통제 / 마취제: Ketamine, Tramadol

기타 약물들: Demenhydrinate, Diphenhydramine, Edrophonium, Indapamide, Metoclopramide, Terfenadine/Fexofenadine

\* 국소 마취제로의 Lidocaine의 사용 시 소량만 사용하거나 adrenaline (에피네프린)과 섞어 주사한다면 안전성을 높일 수 있습니다.

열이 나는 경우에는 체온을 떨어뜨리는 치료(Paracetamol/Acetaminophen의 사용)와 더불어 심전도 변화에 대한 관찰이 필요합니다.

위의 약 성분이 포함되어 있는 복합제의 사용에도 주의를 당부 드립니다. 또한 어떠한 약이 위의 명단에 포함되어 있는지 없는지가 개개인의 환자에서 확실한 위험 또는 안전을 보장하지 않습니다.

부루가다 증후군 환자에서 피해야 할 약에 대한 가장 최근의 권고 사항을 확인하려면, <http://www.brugadadrugs.org> 사이트를 방문하여 주십시오.

\_\_\_\_\_ 올림