

Pacjent: _____

Data urodzenia: _____

Szanowna Pani Doktor/ Szanowny Panie Doktorze,

Ze względu na rozpoznanie u chorego zespołu Brugadów (na podstawie kryteriów klinicznych i/lub wyniku badania genetycznego) nie należy stosować następujących leków:

LEKI, KTÓRYCH NIE NALEŻY PODAWAĆ

- Leki antyarytmiczne*: ajmalina, allapininina, etacizyna, flekainid, pilsikainid, prokainamid, propafenon
- Leki psychotropowe: amitryptylina, klomipramina, dezypramina, lit, loksapina, nortryptylina, okskarbazepina, trifluoperazyna
- Leki p/bólowe i anestetyki*: bupiwakaina, prokaina, propofol
- Inne leki/substancje: acetylocholina, marihuana (*Cannabis*), kokaina, ergonowina, nadmierne spożywanie alkoholu

* Proszę zapoznać się ze stroną <http://www.brugadadrugs.org/emergencies>

LEKI, KTÓRYCH LEPIEJ UNIKAĆ

- Leki antyarytmiczne: amiodaron, cybenzolina, dizopiramid, lidokaina*, propranolol, werapamil, wernakalant
- Leki psychotropowe: bupropion, karbamazepina, klotiapina, cyjamemazyna, dosulepina, doksepina, flouksetyna, fluwoksamina, imipramina, maprotylina, paroksetyna, fenytoina, tiorydazyna
- Leki p/bólowe i anestetyki: ketamina, tramadol
- Inne leki: dimenhidrynat, difenhydramina, edrofonium, indapamid, metoklopramid, terfenadyna /feksofenadyna,

UWAGI

* stosowanie lidokainy w znieczuleniu miejscowym (np. w czasie zabiegów dentystycznych) wydaje się bezpieczne, jeśli stosuje się małe ilości lidokainy w połączeniu z adrenaliną (epinefryną), co zapewnia jedynie miejscowe działanie leku.

W przypadku gorączki zaleca się monitorowanie ekg oraz skuteczne obniżanie temperatury ciała (np. przy pomocy paracetamolu).

Proszę zwrócić uwagę, że wymienione powyżej leki mogą być zawarte w preparatach złożonych.

Ponadto, brak leku na powyższej liście nie wyklucza jego potencjalnego działania proarytmicznego.

Aktualna lista leków, których należy unikać w zespole Brugadów jest dostępna na stronie <http://www.brugadadrugs.org>.

Z poważaniem,
