

Hasta Ad Soyad: _____

Doğum Tarihi: _____

Değerli Meslekdaşım,

Yukarıda ismi geçen hastada, Brugada sendromunun kardiyolojik ve/veya genetik kanıtları olması nedeniyle, aşağıdaki ilaçları kullanmamasını öneriyorum:

KULLANILMAMASI GEREKEN İLAÇLAR

Antiaritmik ilaçlar*: Ajmalin, Allapinin, Etasizin, Flekainid, Pilsikainid, Prokainamid, Propafenon

Psikotropik ilaçlar: Amitriptilin, Klomipramin, Desipramin, Lityum, Loksapin, Nortriptilin, Okskarbazepin, Trifluoperazin

Anestetik/analjezikler*: Bupivakain, Prokain, Propofol

Diğer maddeler : Asetilkolin, Alkol (toksik), Kannabis, Kokain, Ergonovin

*Öneriler için lütfen www.brugadadrugs.org/emergencies websitesini ziyaret ediniz.

KAÇINILMASI TERCİH EDİLECEK İLAÇLAR

Antiaritmik ilaçlar: Amiodaron, Sibenzolin, Dizopiramid, Lidokain*, Propranolol, Verapamil, Vernakalant

Psikotropik İlaçlar : Bupropion, Karbamazepin, Klotiapin, Siyamemazin, Dosulepin, Doksepin, Fluoksetin, Fluvoksemin, İmipramin, Lamotrijin, Maprotilin, Paroksetin, Perfenazin, Fenitoin, Tioridazin

Anestetik/analjezikler : Ketamin, Tramadol

Diğer maddeler : Dimenhidrinat, Difenhidramin, Edrofonyum, İndapamid, Metoklopramid, Terfenadin/Feksofenadin

*Lidokainin lokal anestezi amaçlı kullanımı (örn. diş hekimleri) eğer miktar düşük tutulur ve adrenalin (epinefrin) ile kombine edilirse sadece lokal olarak etkili olacağından güvenli kabul edilebilir.

Hastanın ateşinin yükselmesi durumunda yakın (EKG) monitorizasyon yapılmalı ve aynı zamanda vücut sıcaklığı düşürülmelidir (örn. Parasetamol/Asetaminofen kullanılarak).

Lütfen kombine ilaç içeren preparatlardaki aktif ilaçlar hakkında dikkatli olun. Ayrıca bu listede olan ya da *olmayan* bir ilacın kullanımının bu hastaya bir zararı olacağını ya da *güvenli* kullanılabileceğini dışlamaz.

Brugada sendromu hastalarının kullanmaması gereken ilaçlar hakkında en güncel öneriler için lütfen <http://www.brugadadrugs.org> websitesini ziyaret ediniz.

Saygılarımla
