

Пациент: \_\_\_\_\_

Дата на раждане: \_\_\_\_\_

Уважаеми колега,

Поради наличие на кардиологични и/или генетични данни за синдром на Бругада при гореспоменатия пациент го посъветвах да не приема следните лекарства:

### **ПРОТИВОПОКАЗАНИ ЛЕКАРСТВА**

Антиаритмични лекарства\*: Аймалин, Алапинин, Етацизин, Флекаинид (Амаритон), Пилзикаинид, Прокаинамид, Пропафенон (Ритмонорм, Ритмокард)

Психотропни лекарства: Амитриптилин, Кломипрамин, Дезипрамин, Литий, Локсапин, Нортриптилин, Окскарбазепин, Трифлуоперазин

Анестетици / аналгетици\*: Бупивакаин, Прокаин, Пропофол (Диприван)

Други вещества: Ацетилхолин, Алкохол (токсичност), Канабис (марихуана), Кокаин, Ергоновин

\*За справка моля посетете [www.brugadadrugs.org/emergencies](http://www.brugadadrugs.org/emergencies)

### **ЛЕКАРСТВА, КОИТО Е ЗА ПРЕДПОЧИТАНЕ ДА СЕ ИЗБЯГВАТ**

Антиаритмични лекарства: Амидарон (Кордарон), Цибензолин, Дизопирамид, Лидокаин\*, Пропранолол (Обсидан), Верапамил (Изоптин, Изокор), Вернакалант

Психотропни лекарства: Бупропион, Карбамазепин, Клотиапин, Циамемазин, Досулепин, Доксепин, Флуоксетин, Флувоксамин, Имипрамин, Ламотригин, Мапротилин, Пароксетин, Перфеназин, Фенитоин, Тиоридазин

Анестетици / аналгетици: Кетамин, Трамадол

Други вещества: Дименхидринат, Дифенхидрамин, Едрофониум, Индапамид, Метоклопрамид, Терфенадин/Фексофенадин

\* Използването на лидокаин за местна анестезия (напр. от стоматолози) изглежда безопасно, ако приложеното количество е малко и ако е комбиниран с адреналин (епинефрин), което ограничава ефекта му само до локален.

Освен това, в случай на повишена температура е уместно внимателно наблюдение (вкл. чрез ЕКГ) и едновременно понижаване на телесната температура (напр. чрез Парацетамол/Ацетаминофен).

Моля, не забравяйте, че комбинираните лекарства могат да съдържат някое от горните вещества. Освен това, присъствието *или отсъствието* на конкретно лекарство в този списък не изключва никаква вреда или, напротив, безопасно *използване* на това лекарство при този пациент.

За най-актуални препоръки (и отказ от отговорност) относно лекарствата, които трябва да се избягват при пациенти със синдром на Бругада, моля посетете <http://www.brugadadrugs.org>.

Искрено Ваш,

\_\_\_\_\_